

ROOTEX®

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Nitrógeno (N)	6.5%
Fósforo (P ₂ O ₅)	46.0%
Potasio (K ₂ O)	5.5%
L-Aminoácidos y ácidos orgánicos	19.0%

ASPECTO FÍSICO: Polvo soluble

PRESENTACIÓN: Bolsa de 1 kg y 10 kg.

INFORMACIÓN GENERAL:

ROOTEX es una combinación aminoácidos, ácidos orgánicos y nutrientes cuya finalidad es inducir la emisión de raíces así como fortalecer su crecimiento posterior.

Los beneficios generales del reforzamiento del sistema radicular son: Una mayor capacidad exploratoria del suelo, una mejor formación de tejidos vasculares y una mayor capacidad de sintetizar hormonas que en conjunto establecen condiciones para un mayor potencial productivo.

Nuestras recomendaciones tienen carácter general y se basan en resultados obtenidos de experimentación confiable. Sugerimos ajustarlas siempre a los requerimientos del cultivo y a programas de nutrición basados en análisis de suelo y tejidos confiables.

INDICACIONES DE USO:

ROOTEX es un producto para la aplicación al suelo en cultivos anuales y perennes, bajo condiciones de riego por gravedad y presurizado, así como cultivos bajo condiciones de temporal.

Nuestras recomendaciones tienen un carácter general, y se basan en resultados obtenidos de experimentación confiable. Sugerimos ajustarlas siempre a los requerimientos del cultivo y a programas de nutrición basados en análisis confiables de suelo y tejidos.

Rev2: 09/2022 1/2



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ETAPA	TIPO DE APLICACION	DOSIS (Kg/Ha)	OBSERVACIONES
FRUTALES (vid, palto, cítricos, manzanos, nogal, berries, naranjos, limones, mandarinos, duraznos, nectarines, ciruelas, almendros, demascos, peral, arándanos, moras, frambuesa, kiwi, papayas, chirimoyas.)	Establecimiento	Riego Gravitacional o Tecnificado	5	Hacer la primera aplicación al transplante, repetir una o dos veces según desarrollo, con un intervalo de 21 días
	Desarrollo	Riego Gravitacional o Tecnificado	5-10	Hacer dos aplicaciones.
	POSTCOSECHA Previo a Receso	Riego Gravitacional o Tecnificado	5	Dirigir aplicación a último "flush radicular"
HORTALIZAS (tomate, papa, ají, sandía, melón, cebollas, ajo, berenjena, pepino, coliflor, brócoli, repollo brucelas, repollo, lechuga, espinaca, acelga, beterragas, zanahoria, poroto verde, arvejas, habas, frutilla, poroto, maíz dulce, etc.)	Establecimiento	Riego por goteo	5	Hacer la primera aplicación al transplante, repetir en la segunda y tercera semana.
		Planta por planta	5	Hacer aplicación al pie de la planta, procurando hacer una distribución uniforme de la solución.
	Desarrollo	Almácigos por inmersión preplantación.	5-10 gr / It de agua	Inmersión de raíces por 15 minutos, previo al transplante

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Utilice overol, gorro, lentes y mascarilla, así como aguantes y botas tipo industrial, para evitar el contacto y la inhalación del producto. No comer o fumar durante las aplicaciones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

No contamine corrientes o cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión, haga lavado estomacal y siga con aplicar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación lleve al paciente con el médico y muéstrele la etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa, forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie

Rev2: 09/2022 2/2