



CULTIVOS INTENSIVOS

NIXI



Powered by
Foliflo
Technology

La tecnología de alto contenido de nutrientes en suspensión.

NIXI ayuda a mitigar trastornos fisiológicos asociados con la disponibilidad limitada de calcio en el nivel de la pared celular.

Produce un sistema radicular más fuerte; un crecimiento de los frutos más rápido y de mayor coloración.

 **FertiGlobal®**

La nutrición eficiente de los cultivos
combinada con servicios técnicos avanzados

FertiGlobal® puede asegurar las mejores soluciones tecnológicas para fortalecer las plantas durante todas las fases de crecimiento y asegurar el máximo a través del rendimiento saludable de las plantas.



Powered by
Foliflo
Technology

CULTIVOS INTENSIVOS

Acerca de la tecnología

- Suspensión de alto análisis
- Formulaciones estables en temperaturas frías y calientes
- Formulaciones a base de agua
- Formulaciones libres de nitrato, sulfato y cloruro.

Para asegurar

- Fácil absorción por el tejido de la hoja
- Alta resistencia contra condiciones de estrés abiótico
- Plantas sanas
- Más biomasa
- Sin riesgo de fitotoxicidad

Composición Calcio Total (CaO) 34,9% (598 g/L)

Formulación Suspensión concentrada

Recomendaciones de uso

CULTIVOS	Aplicación Vía Foliar	
	Dosis (por aplicación)	Momento de Aplicación
Hortalizas de fruto	2 - 3 L/ha	Aplicaciones semanales durante crecimiento y maduración de frutos
Hortalizas de hoja	1,5 - 2 L/ha	Aplicaciones cada 8-10 días a partir de 6-8 hojas verdaderas
Vid y Berries	2 L/ha	3-4 Aplicaciones cada 10-14 días a partir de cuaje de fruto
Frutales de Carozo	1 - 2 L/ha	2-3 Aplicaciones cada 10-14 días a partir de cuaje de fruto
Pomáceas	2 L/ha	4-5 Aplicaciones cada 10-14 días desde fruto con 2-3 cm de diámetro

CULTIVOS	Aplicación Vía Suelo	
	Dosis (por ciclo)	Momento de Aplicación
La dosis a aplicar depende del tipo de suelo y del contenido de calcio disponible en el mismo		
Hortalizas de fruto	30 - 60 L/ha	Aplicar cada 15 días 3 - 5 L/ha hasta llegar al consumo por ciclo
Hortalizas de hoja	10 - 20 L/ha	Aplicar cada 15 días 3 - 5 L/ha hasta llegar al consumo por ciclo
Vid y Berries	50 - 100 L/ha	Aplicar cada 15 días 3 - 5 L/ha hasta llegar al consumo por ciclo
Frutales de Carozo	50 - 100 L/ha	Aplicar cada 15 días 3 - 5 L/ha hasta llegar al consumo por ciclo
Pomáceas	50 - 100 L/ha	Aplicar cada 15 días 3 - 5 L/ha hasta llegar al consumo por ciclo



FertiGlobal®