

CULTIVOS INTENSIVOS

COLORE



Powered by
Folimac[®]
Technology

La tecnología con nutrientes fácilmente disponibles

COLORE es un fertilizante potásico completamente soluble, con nitrógeno (N), azufre (S) y boro (B), para la pulverización foliar de rápida absorción y la fertirrigación.

La formulación de alto contenido de nutrientes de COLORE, baja en cloruro, estimula la acumulación de azúcar, tanto en las plantas como en sus frutos, aumentando el color y el tamaño de la fruta.

COLORE se aplica en cultivos hortícolas y frutales como integrador nutricional para ayudar al cultivo a superar estrés abiótico (sequías, enfermedades) e inducir resistencia al almacenamiento en frío.

 **FertiGlobal**[®]

La nutrición eficiente de los cultivos
combinada con servicios técnicos avanzados

FertiGlobal[®] puede asegurar las mejores soluciones tecnológicas para fortalecer las plantas durante todas las fases de crecimiento y asegurar el máximo a través del rendimiento saludable de las plantas.



Powered by
Folimac[®]
Technology

CULTIVOS INTENSIVOS

Acerca de la tecnología

- Nutrientes vegetales combinados con eficiente Nitrógeno disponible
- Formulaciones nutritivas ad hoc
- Nutrientes de alta calidad
- Sin cloruro en las materias primas

Para asegurar

- Disponibilidad duradera de nutrientes
- Mayor crecimiento y mayores rendimientos
- Prevención de la escasez de nutrientes
- Menos estrés durante las etapas críticas de crecimiento

Composición	Nitrógeno Total (N) 4%	Formulación Polvo soluble
	Potasio total soluble en agua (K ₂ O) 48 %	
	Azufre total soluble en agua (SO ₃) 31%	
	Boro soluble en agua (B) 0,3 %	

Recomendaciones de uso

CULTIVOS	Aplicación Vía Foliar	
	Dosis (kg/ha)	Momento de Aplicación
Papa	2 - 4	2-3 Aplicaciones a partir de tuberización cada 15- 20 días
Hortalizas de Fruto	2 - 4	2-4 Aplicaciones a partir de cuaje de los frutos cada 15 días
Hortalizas de hoja y Brasicáceas	2 - 3	1-3 aplicaciones cada 15 días a partir de maduración de frutos o formación de cabeza en hortalizas de hoja
Hortalizas de bulbo	1,5 - 2	1- 2 aplicaciones cada 20 días a partir de inicio de bulbificación
Berries (Arándano, Frutilla, Frambuesa)	1,5 - 3	Aplicaciones cada 15-20 días desde comienzo de maduración de los frutos
Vid	2 - 4	2-4 aplicaciones cada 15-20 días desde cambio de color de los frutos de los frutos
Frutales	3 - 4	2-4 aplicaciones cada 15-20 días desde cambio de color de los frutos de los frutos
Citricos	2 - 3	2-3 Aplicaciones cada 15 días a partir de un mes antes del cambio de color de los frutos
Olivo	4 - 5	1 Aplicación durante el desarrollo de los frutos y 1 aplicación otoñal poscosecha



FertiGlobal[®]